


# Ведення пацієнтів із психотичними розладами

До вашої уваги представлено графічне узагальнення рекомендацій щодо ведення пацієнтів із психотичними розладами. Наведена інфографіка є демонстраційною та необов'язковою для застосування у клінічній практиці. Термін «психоз» охоплює сукупність проявів, які включають «позитивні» (галюцинації, маячні ідеї) та «негативні» симптоми (зниження здатності отримувати насолоду та мотивації).



## Диференційна діагностика позитивних симптомів

Позитивні симптоми психотичних розладів дуже різняться між собою і можуть проявлятися при інших патологіях, дефіцитарних станах та інфекційних захворюваннях



## Ведення пацієнтів із психотичними розладами

Рекомендоване раннє звернення до фахівців. Однак за випадків, які потребують тривалого спостереження, можна розглянути надання допомоги на первинній ланці.



Адаптовано згідно з Sami M.B. et al. Early psychosis for the non-specialist doctor // BMJ, 2017; 357: i4578  
Оригінальний текст документа читайте на сайті [www.bmj.com](http://www.bmj.com)

# Еголанза

О Л А Н З А П І Н



Склад та форма випуску:  
табл. в/о, оболонкою 5 мг блістер, № 28  
табл. в/о, оболонкою 10 мг блістер, № 28

### Показання

- Лікування шизофренії
- Підтримка досягнутого клінічного ефекту при тривалій терапії у пацієнтів, у яких спостерігалася відповідь на початкову терапію
- Лікування маніакальних епізодів помірного та тяжкого ступеня
- Профілактика повторних нападів у пацієнтів з біполярними розладами, у яких було отримано позитивну відповідь при лікуванні оланзапіном манії

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин препарату; відомий ризик закритокутової глаукоми.  
**Побічні реакції.** Сонливість, збільшення маси тіла, підвищення рівня пролактину, холестерину, глюкози і тригліцеридів в крові, підвищення апетиту, запаморочення, астения, стомлюваність та інші.  
**Категорія відпуску.** Відпускається за рецептом лікаря.  
**Р.Л. №** UA/11344/01/01, № UA/11344/01/02.

# КЕТИЛЕПТ®

К В Е Т І А П І Н



Склад та форма випуску:  
табл. в/плів, оболонкою 25 мг блістер, № 30  
табл. в/плів, оболонкою 100 мг блістер, № 30  
табл. в/плів, оболонкою 200 мг блістер, № 30

### Показання

- Лікування шизофренії
- Лікування біполярних розладів, включаючи: маніакальні епізоди від помірного до тяжкого ступеня, пов'язані з біполярними розладами; великі депресивні епізоди, пов'язані з біполярними розладами
- Профілактика рецидивів у пацієнтів із біполярними розладами, у яких маніакальні напади піддавалися лікуванню кветіапіном

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату; одночасний прийом інгібіторів цитохрому P450 3A4.  
**Побічні реакції.** Сонливість, запаморочення, сухість у роті, запор, помірна астения, тахікардія, ортостатична гіпотензія та диспепсія.  
**Категорія відпуску.** Відпускається за рецептом лікаря.  
**Р.Л. №** UA/8157/01/01-03.

# Рілепід®

Р И С П Е Р И Д О Н



Склад та форма випуску:  
табл. в/о 2 мг блістер, № 20

### Показання

- Лікування шизофренії та інших психічних розладів (у тому числі підтримуюча терапія)
- Лікування маніакальних епізодів при біполярних розладах
- Короткочасне лікування вираженої агресії або тяжких психічних симптомів у пацієнтів з деменцією при існуванні загрози заподіяння шкоди собі чи іншим
- Симптоматичне лікування зухвалих опозиційних розладів або інших розладів соціальної поведінки у дітей, підлітків та дорослих з розумовим розвитком нижче середнього або з розумовою відсталістю, які мають прояви деструктивної поведінки
- Симптоматичне лікування аутичних розладів у дітей віком від 5 років, у яких симптоми варіюють від гіперактивності до роздратованості

**Протипоказання.** Гіперчутливість до активного компонента або до будь-якої допоміжної речовини у складі препарату.  
**Побічні реакції.** Найчастішими побічними реакціями, про які повідомляється, є паркінсонізм, головний біль та безсоння.  
**Категорія відпуску.** Відпускається за рецептом лікаря. **Р.Л. №** UA/4044/01/02

Інформація для професійної діяльності фахівців в області охорони здоров'я. Детальна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату.

Представництво «ЕПС ФАРМАС'ЮТИКАЛС ПЛС» в Україні:  
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.  
Тел.: +38 (044) 496 05 39, факс: +38 (044) 496 05 38

